

25. VIÊM ÂM ĐẠO DO TRICHOMONAS

Là một bệnh lây truyền qua đường tình dục và do trùng roi *Trichomonas vaginalis*.

I. Nguyên nhân

Nhiễm *Trichomonas vaginalis*.

II. Chẩn đoán

- Lâm sàng
 - + Huyết trắng nhiều, màu vàng hay xanh loãng, có bọt, có mùi tanh.
 - + Có thể ngứa, tiểu rát.
 - + Trường hợp nặng: có dấu hiệu trái dấu tây: âm đạo và cổ tử cung có những điểm xuất huyết nhỏ, lấm tấm.
- Cận lâm sàng
 - + Soi tươi: trùng roi di động và nhiều bạch cầu.

III. Điều trị

- Metronidazole/ Secnidazole/Tinidazole 2g uống 1 liều duy nhất, hoặc
- Metronidazol 500mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống trong bữa ăn).

Chú ý: luôn luôn điều trị cho bạn tình

- Metronidazol 2g uống 1 liều duy nhất.
- Không dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ.

IV. Theo dõi

- Tái khám khi có gì lạ.
- Khám phụ khoa định kỳ.