

DÒ LUÂN NHĨ

1. ĐỊNH NGHĨA

- Đây là bệnh bẩm sinh và khá phổ biến. Mới sinh đã có lỗ dò trước và trên bình tai.
- Phần lớn dò luân nhĩ không gây triệu chứng khó chịu gì, một số có chảy dịch, viêm nhiễm hay ap-xe hóa.

2. TRIỆU CHỨNG

- Lỗ dò trước và trên bình tai trong đa số trường hợp. Một số có lỗ dò ở những vị trí khác: gờ đối luân, lỗ dò xuyên sụn ra sau tai,...
- Khi nhiễm trùng: sưng đỏ và đau, có bọc mù.

3. XỬ TRÍ

3.1. Điều trị nội khoa: với những dò luân nhĩ đang trong giai đoạn nhiễm trùng.

- Rửa dẫn lưu mù.
- Kháng sinh: các kháng sinh: nhóm Beta-lactam, Cephalosporin thế hệ I, II hoặc III (Ví dụ: Augmentin, Zinacef, Fortum,...)
- Giảm đau: Paracetamol liều tối đa 60mg/kg/ngày.
- Kháng viêm, chống phù nề: Serratiopeptidase, Lysozym, Alpha chymotrypsine: 1-2 viên x 3 lần/ ngày.

3.2. Điều trị ngoại khoa: với những dò luân nhĩ ổn định, không viêm.

- Mồ dướì gây mê đối với trẻ em, có thể gây tê trên người lớn.
- Bơm Xanh Methylene dưới áp lực vào đầu lỗ dò.
- Rửa da xung quanh lỗ dò.
- Bóc tách lấy trọn đường dò theo chỉ dẫn màu xanh của Xanh Methylene, tránh phạm vào động mạch thái dương nông.
- May da 2 lớp.